

Fegl d'infuraziun da la Conferenza dals uffizis da las scolas popularas da la Svizra tudestga sco agid d'orientaziun

Proceder en cas che uffants en scolina (1^H e 2^H)* han sintoms da malsogna e da dafraid

Infuraziuns e recumandaziuns per geniturs

Valaivel fin il mars 2022

I sto vegnir testà, sche:

- l'uffant ha gi stregt contact (contact da ristga) cun ina persuna cun sintoms/sintomatica sur 6 onns
- l'uffant ha gi stregt contact (contact da ristga) cun ina persuna cun in test positiv – independentament da la vegliadetgna
- l'uffant ha – er senza contact da ristga – almain in dals sintoms marcads cun cotschen (sintoms d'ina malsogna cronica enconuschenta n'en betg relevants)

Dafraid e/u mal la gula cun/ senza leva tuss senza fevra

Ferma tuss, sche quella na vegg betg chaschunada d'ina malsogna cronica,
p.ex. asma e/u

fevra sur 38,5 grads

L'uffant stat uschiglio bain

L'uffant stat uschiglio bain

L'uffant na stat betg bain

gea

Voss uffant resta a chasa
Infumar la persuna d'instruziun!

na

Sa mussan ulteriuras suffrientschas?

- mal il magun e la beglia
- mal il chau
- mal las giugadiras
- perdita dal palat e da l'odurat

gea

Sa mussa in cler meglierament entaifer traies dis?

na

Contactai la media u il medi da Voss uffant.

La media u il medi decida davart l'ulteriur proceder, tranter auter sch'i duai vegnir fatg in test.

gea

N'ha Voss uffant gi nagina fevra durant almain 24

negativ

Il resultat dal test è ...

positiv

Tranter il test e la communicaziun dal resultat **na va l'uffant betg a scola!**

Ulteriurs pass tenor las indicaziuns dal contact tracing, accumpagnament tras la media responsabla u il medi responsabel.
L'uffant resta a chasa.

Suenter che l'isolaziun è terminada

Voss uffant dastga ir a scolina

Fegl d'infurmaziun da la Conferenza dals uffizis da las scolas popularas da la Svizra tudestga sco agid d'orientaziun

Proceder en cas che uffants e giuvenils dal stgalim primar e superiur (3^H – 11^H)* han sintoms da malsogna e da dafraid

Infurmaziuns e recumandaziuns per geniturs

Cura sto Voss uffant star a chasa?

Tar uffants e giuvenils dal stgalim primar e superiur (ciclus 3^H – 11^H)* valan da nov ils medems criteris clinicis sco tar persunas creschidas. Quai vul dir:

En cas da sintoms da malsogna e da dafraid che correspundan a quels da COVID-19, resta l'uffant resp. la giuvenila u il giuvenil a chasa e va a far in test tar ina media u in medi.

- Sch'il test è positiv, sto l'uffant resp. la giuvenila u il giuvenil ir en isolaziun.
- Sch'il test è negativ, sto l'uffant resp. la giuvenila u il giuvenil restar a chasa, fin ch>ella u el è stà durant 24 uras senza fevra. Cura ch>ella u el sa senta puspè bain ed è en in bun stadi general, po l'uffant resp. il giuvenil u la giuvenila puspè ir a scola.

Cun quest proceder simpel na dovra la scola primara e secundara betg in agen schema da procedura.

*tenor la scripzion HarmoS